

## PROBLEMAS

### Problemas propostos ao concurso

#### SECÇÃO ELEMENTAR

**3822** — Considere um triângulo equilátero  $[ABC]$  de lado  $a$ . Sejam  $Q$  um ponto do interior do  $\overline{AB}$  tal que  $\overline{QA} = a:n$ , e  $P$  um ponto do prolongamento de  $\overline{BC}$  de modo que  $C$  fica entre  $B$  e  $P$  e tal que  $\overline{CP} = a$ . Seja ainda  $R$  o ponto de encontro das rectas  $\overline{AC}$  e  $\overline{PQ}$ . Calcule a área do quadrilátero  $[QRCB]$ .

**3823** — Verificar a identidade

$$\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

#### SECÇÃO MÉDIA

**3824** — Prove que é  $\text{sen } x > \frac{2x}{\pi}$  para  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ .

**3825** — O número de números de FIBONACCI compreendidos entre  $n$  e  $2n$ , é ou 1 ou 2.

#### Resoluções dos problemas do concurso propostos no n.º 55

**3669** — (N.º errado 3650). Apresentaram soluções correctas os Srs. Fernando de Jesus e Vinha Novais, publicando-se a deste último:

R: Seja  $P$  o ponto médio do lado  $BC$ ;  $O$  o ponto médio de  $AP$  e  $Q$  o ponto de intersecção de  $r \equiv CO$  com  $AB$ . Pelo vértice  $B$  tracemos  $r'/r$ ; seja  $R$  o ponto de intersecção de  $r'$  com  $AP$ . Os triângulos  $BRP$  e  $COP$  são iguais ( $CP=BP$ ,  $\sphericalangle B = \sphericalangle C$ ,  $\sphericalangle BPR = \sphericalangle CPO$ ) e, portanto,  $RP = OP$ ; mas  $OP = OA$  (hipótese) e portanto  $OA/OR = 1/2$ . Por outro lado tem-se  $AO/OR = AQ/QB$ . Atendendo a estas duas relações vem  $AQ/QB = 1/2$ .

**3670** — (3651). Apresentou solução correcta o Sr. Vinha Novais a qual se publica:

R: Do simples exame da equação dada resulta que o ponto  $P_1(x=3, \mu=0)$  é comum a todas as circunferências da família dada. Notando agora que o lugar geométrico dos centros dessas circunferências é uma recta de equação  $r \equiv \mu = \varphi + \frac{1}{2}$ , as circunferências passarão igualmente pelo ponto  $P_2$  simétrico de  $P_1$  em relação a  $r$ . Determinando as coordenadas desse ponto obtém-se  $P_2\left(\varphi = -\frac{1}{2}, y = \frac{7}{2}\right)$ . Não poderá haver mais pontos comuns pois três pontos determinam uma circunferência e uma só.

**3671** — (3652) Não foram apresentadas soluções.

**3672** — (3653) Não foram apresentadas soluções.

**3673** — (3654) Apresentou solução correcta que se publica, o Sr. Vinha Novais:

R: 1. Da igualdade  $ab \cdot x = ba$  resulta multiplicando à esquerda pelo inverso de  $ab$ ,  $x = (ab)^{-1} \cdot ba = b^{-1} a^{-1} ba$ ; multiplicando ambos os membros da igualdade  $y \cdot ab = ba$ , à direita por  $(ab)^{-1}$  vem  $y = ba (ab)^{-1} = ba b^{-1} a^{-1}$ . Ficam assim determinados os comutadores do par  $ab$  e, portanto, demonstrada a sua existência.

2. Representemos por  $x$  e  $y$  os comutadores do par  $a^{-1} b^{-1}$ ; então  $a^{-1} b^{-1} \cdot x = b^{-1} a^{-1}$  e  $y a^{-1} b^{-1} = b^{-1} a^{-1}$ . Multiplicando a primeira igualdade à direita por  $x^{-1}$  e a segunda, à esquerda, por  $y^{-1}$  vem  $a^{-1} b^{-1} = b^{-1} a^{-1} \cdot x^{-1}$  e  $a^{-1} b^{-1} = y^{-1} b^{-1} a^{-1}$ , o que mostra que o comutador à direita (esquerda) do par  $b^{-1} a^{-1}$  é o elemento inverso do comutador à direita (esquerda) do par  $a^{-1} b^{-1}$ .

**3674** — (3655) Não foram apresentadas soluções.

Errata ao n.º 57 da G. M.: A resolução n.º 3781 deve ser 3651.

## BOLETIM BIBLIOGRÁFICO

Nesta secção, além de extractos de criticas aparecidas em revistas estrangeiras, serão publicadas criticas de livros e outras publicações de Matemática de que os Autores ou Editores enviarem dois exemplares à Redacção.

**104** — REIDT, WOLFF — *Die Elemente der Mathematik (Arithmetik, Algebra und Analysis)*, Oberstufe-Band 3, Hermann Schroedee Verlag, Hannover, 348 páginas (1953).

Contém este livro a matéria comumente ensinada nos últimos 3 anos dos liceus científicos alemães. Uma 1.ª parte («Problemas de Aritmética») trata de progressões aritméticas e geométricas e da teoria dos números (naturais, reais e complexos), construída com particular meticulosidade. Uma 2.ª parte («Algebra») é dedicada ao estudo de equações algébricas, especialmente à equação de 3.º grau (métodos numéricos e gráficos) e inclui mais dois capítulos, um

sobre nomografia e outro sobre a fórmula do binómio. Em tudo o resto, trata-se de cálculo infinitesimal: depois de construída a teoria dos limites para sucessões e para funções, introduz-se o cálculo diferencial e em seguida o cálculo integral (para funções duma só variável); finalmente é feito um estudo das séries numéricas e das séries de potências.

Na orientação didáctica predomina o carácter intuitivo e genético, com abundância de evocações históricas (descurando por vezes a estruturação lógica).

O livro é ricamente provido de bons exercícios sobre todos os assuntos e apresenta-se com óptimo aspecto gráfico.

J. Sebastião e Silva.